

אבקה רטיבה W.P
קוטל פטריות סיסטמי
להדברת מחלות צמחים



טופז®

طوباز | Topaz

דרגת רעילות: IV - מסוכן

מס' או"ם: 3077

מיוצר ע"י: Nippon Soda Co.Ltd,

יפן

מכיל: Thiophanate Methyl 70%

רשיון השירותים להגנת הצומח מס': 13/ה"צ/73

קרא בעיון את התווית לפני השימוש

כללי:

טופז קוטל פטריות סיסטמי. למניעת והדברת מחלות צמחים. לאחר קליטתו על-ידי הצמח הופך לבנזמידאזול. אין לטפל בתכשיר זה יותר משני יישומים עוקבים. לפני החזרה לשימוש בתכשיר, יש ליישם שני טיפולים בתכשיר בעל חומר פעיל שונה, רצוי שיהיה מקבוצה כימית שונה או בעל מנגנון פעולה שונה, להדברת אותו צירוף גידול פגע.

לרשותכם בכל שאלה | צוות אדמה מכתשים 03-6577577

אופן היישום:

מועד אחרון לפני אסיף (ימים)	נפח תרסיס (ל'/ד')	מרווחי ריסוס	ריכוז או מינון (ג'/ד')	מחלה	הגידול
21	גבוה עד נגירה	בתחילת העונה, מהלבלוב עד סוף אפריל, כל 7-10 ימים. מסוף אפריל עד סמוך לקטיף, כל 10-14 יום.	0.05-0.03% בהתאם לעוצמת הנגיעות ועונת הטיפול	גרב האגס*	אגס
21	גבוה עד נגירה	אחת כל 7-10 ימים מתחילת הלבוב, אחת ל-14-21 יום החל מחדש יוני עד הקטיף. בטיפולים להדברת גרב בתפוחי עץ יודבר גם קימחון.	0.05%	גרב התפוח (רקבון סברופטיס*)	תפוח
21	40	אחת ל-20 יום מגיל 5 שבועות מומלץ לרסס לאחר השקיה	80	כתמת (צרקוספורה)	אגוזי אדמה
טבילת בצלצולים לפני השתילה ב-0.04% בתוספת 0.05% משטח למשך 30 דקות.				שורש ורוד	בצל
טיפול זה מיועד למניעת הפצת המחלה ע"ג בצלצולים נגועים לקרקעות לא נגועות או למניעת אילוח נוסף של הקרקע במחלה, אך אין בו כדי להגן על בצלצולים הנשתלים באדמה נגועה					
21	עד נגירה	משלב פקע ורוד ועד לשיא פריחה, בהתאם לארועי הגשם	0.05%	רקבון חום (מוניליה)*	משמש, שזיף
90					שקד
3	80-50	אחת ל-7 ימים	100	עובש אפור (בוטריטיס)*	עגבניה
3	80-50	אחת ל-7 ימים	100	קשיונה גדולה	מלפפון
3					קישוא
7	40-25	אחת ל-7 ימים	100	קשיונה גדולה	גזר
					חסה

* במקרה של רקבון חום (מוניליה), גרב ועובש אפור (בוטריטיס) יש לרסס פעמיים בעונה ולא ברצף.

שילובים מותרים:

באגס, ניתן לשלב טופז עם רימון פאסט.